

Rapport 42.

des observations Communiquées à l'Académie
Royale de chirurgie, par M^r. Vermillet
Chirurgien à Charicy par Vesoul

1^{re} Observation

Sur la ~~cure~~ de la pustule maligne



+ le 3.

un laboureur, âgé de 20 ans, fut attaqué au commencement de
l'été 1779^t, de la pustule maligne, qui se manifesta au menton &
par une tumeur, grosse comme une fève de mauvais, qui était rouge dans
sa circonférence, Noire au Centre, fort dure, très douloureuse et dont
il s'écoulait de la sérosité. Cette tumeur avait été précédée d'une
grande démangeaison et fut bientôt suivie d'un gonflement Consi-
dérable, à la face, au col et à la poitrine. le malade avait peu de
fièvre et de fréquentes envies de vomir. M^r. Vermillet après l'avoir
saigné, Scarifia le Centre et les environs de la tumeur, fit une lotion
avec l'eau de vie dans laquelle on ^{avait} délayé de la thériaque, recouvrit
cette tumeur d'un emplâtre d'ongt. de laivres et appliqua par dessus un
Cataplasme Anodin. quatre heures après, il fit une 2^e Saignée,
leva cet appareil, enleva tout ce qui parut gangrené (ce fut à peu près
la moitié de la tumeur)

Malgré ces moyens, les accidens augmentèrent, le gonflement de
la face, qui était inflammatoire, s'étendait le lendemain jusqu'au
parotides. M^r. Vermillet désespérant du succès, se contenta alors d'ouvrir

ARC 13

a. 39

les phlyctènes, de faire de légères scarifications à la place et à la
 conférence, de la remplir de plumeaux courts, d'égoutter l'urine
 dessus le tout avec de l'esprit de vin camphré et d'appliquer le Cataplas-
 me amonin.

La pluspart des accidens se calmèrent le 5^e jour, les parties
 gangrénées se détachèrent, le pus devint louable, les chairs belles.
 le gonflement de la fesse diminua; Mais celui de la parotide gauche
 augmenta encore et les signes qui annoncent que la suppuration se
 fera, se manifestèrent; ce qui détermina M. Vermillet à employer
 le feu (selon le procédé de M. Fausse) opération qu'il répéta 5 à 6
 fois par jour et après chaque opération, il retournaient latéralement avec
 des compresses trempées dans une décoction de fleurs de Sureau.

+ d'une diète très
 sévère

par l'usage des Moyens, Cy dessus énoncés, des Boissons diluantes
 et rafraichissantes, d'une infusion de KK, des Bouillons attirans
 des lavemens émolliens et des purgatifs; l'engorgement s'est
 dissipé et cette maladie très grave fut guérie en 13 jours.

Cette observation ne peut contribuer aux progrès de nos Connois-
 sances sur cette maladie, dont à la vérité, la nature, les causes,
 les symptômes et la terminaison sont mieux connus, depuis
 que deux Célèbres Académies en ont fait l'objet de leurs travaux.
 La description qu'a fait M. Vermillet, de la tumeur est exacte.
 Mais il nous laisse ignorer quelle en a pu être la cause; il n'a
 fait aucune réflexion sur la Saison où cette maladie a regné,
 sur la nature de l'écarré et les progrès de la mortification. Ce qu'il

3
Ce qui a avancé sur le cavatere de l'engorgement, qui selon le quel
rapporte était inflammatoire, est peu conforme aux observations des
autres praticiens, qui assurent, que cet engorgement tient le milieu entre
l'inflammatoire et l'adumateux, qu'il offre une élasticité semblable à
celle de l'engorgement emphysémateux.



La pratique n'est point exempte aussi de réproches: parmi les diffé-
rents moyens qu'il a mis en usage, il en est qui pouvaient être indiqués, tels que
l'évaluation des deux voyes, la saignée, mais celui-ci ne doit être encore
employé (ainsi qu'il l'a fait) qu'avec la précaution, qu'au commencement
de la maladie et lors que les forces vitales le permettent. ~~Le moyen~~ quelque
praticien croyent même qu'il est dangereux dans cette maladie, mais
c'est, dit M. thomassin, un préjugé qu'il faut détonner.

Les scarifications doivent se borner dans ce cas cy à l'ulcère. leur effet
est de provoquer le dégorgeement des sucs en stagnation sous les parties mortes.
Mais les scarifications portées sur qu'à des parties saines, ainsi que les a faites
M. vermillot, augmentent l'irritation et l'engorgement, le qu'avant ob-
servé plusieurs anciens praticiens et ce que des observations postérieures ont
confirmé.

Nous condamnons également l'application de remèdes irritans sur toute
l'étendue de l'ulcère et des lotions de même nature sur les parties qu'il
venait de pratiquer; nous croyons que l'augmentation des symptômes, l'en-
gorgement consécutif des parotides a pu être l'effet de l'irritation leur usage.

ARC 13 d. 39

Les remèdes ne doivent être appliqués que sur l'écaille et on doit recourir
le reste de l'atmosphère avec des remèdes relâchans et crudiens.

Quant aux remèdes intérieurs: le KK, dont les principales
propriétés sont d'être antiseptique, tonique et astringent, ne pourrait
peut être pas dans une maladie ou la mortification qui est dans pou-
-riture, ne dépend que de l'écaille, de l'engorgement qui suffoque le prin-
-cipe vital, ou les solides sont trop tendus et les liqueurs trop épaisses.

Le remède ne s'empêche que dans les circonstances opposées, ainsi que la
judicieusement observe M^r pringle; et si il en est une dans la pustule
maligne ou il peut être utile, c'est lorsque le séjour du pus cause
quelques accès irréguliers de fièvre.

Nous terminons nos réflexions ainsi que M^r vermillat son
observation, par faire observer que cette maladie très grave a
été guérie; mais nous voyons qu'il s'est trompé de calcul
en disant qu'elle l'a été en 13 jours.

2^e observation

Sur un coup d'arme à feu



Au commencement de jbra 1777, un jeune homme ~~est~~ assis, et
 ayant son fusil sur son épaule droite, la croisa par derrière, vint dans
 sa jambe gauche toute la charge, qui était de plomb moulu et de grosse
 fonte; il en résulta une plaie à lambeau qui s'étendait depuis la
 partie moyenne de la jambe jusqu'à la malléole externe: la plaie péné-
 trait jusqu'au tibia, qui était dépouillé de son périoste intérieurement
 et extérieurement, dans une étendue de deux pouces.

M^r Vermillet ôta les débris des corps étrangers, lava la plaie
 avec de l'eau de vie, et la remplit de charpie, saigna le malade deux
 fois du bras en 5 heures et fit arroser la jambe pendant la nuit, qu'il
~~passa sans dormir~~, avec de l'eau de vie camphrée; et il la passa
~~sans dormir~~ le lendemain à la levée de l'appareil, il trouva un gonflement consi-
 dérable, il fit une 5^e saignée, lava la plaie avec l'eau d'argemone
 et la pansa avec un digestif animé.

L'esclave tomba le 6^e jour, la suppuration s'établit et il sortait
 à chaque pansement avec le pus, des grains de fonte. M^r Vermillet
 mettait sur la portion d'os dénudée un plumasseau trempé dans le
 baume de Fioravanti, ainsi que sur l'étendue du jambon antérieur qui
 était à découvert et qui s'infesta par la suite, ce qui arriva point
 à l'os; il remplissait la plaie de charpie sèche et appliquait par dessus
 des compresses trempées dans l'eau de vie camphrée. Ces pansements furent
 continués quelque temps, la suppuration diminua, le pus devint louable
 les chairs billés; à cette époque il supprima la tente imbuë de baume

Beauvais de Fioravanti qu'il portait sur l'os et la playe fut posée de plat et à sec: un gonflement adematux qui survint fut dissipé en peu de jours avec des lotions de vin aromatique: enfin cette playe large et compliquée fut guérie au mois de jbre suivant, sans aucune exfoliation de la portion d'os découverte et sans difficulté dans les mouvements du pied.

Cette observation ne présente qu'un cas de chirurgie très commun. C'est une playe à l'ambreau, contuse, à l'extrémité de l'alaule et produite par une arme à feu: la grandeur de cette playe est laquin a frappé me vermillon ainsi que sa guérison, sans ^{peu de} ~~gêne~~ dans les ~~la~~ gêne dans les mouvements de l'articulation de la jambe avec le pied (le tendon du jambier antérieur ayant été détruit) et sans que la portion d'os décolorée se soit exfoliée.

L'opérative est encore moins rationnelle dans le cas-ci que dans
le précédent. Si on n'avait pas égard à la grandeur de la plaie
qui n'interrompt que les tégumens, ^{et} à sa forme, on pourrait lui
reprocher de n'avoir pas fait au premier coup l'incision des dilatations
vélo-mandibulaires et dont l'utilité ^{a été} reconnue jusqu'à ce jour, par
tous les praticiens. Ce devait être au moins pour M. L.
le sujet d'une remarque sur cette loi constante. Mais ce qui
est très condamnable, c'est les lotions de la plaie avec les
remèdes spirituels ^{neutres} ~~les remèdes~~ ~~de différents auteurs~~ ~~au lieu d'être~~
~~cette lotion de chaux sodique dont on se servait avant.~~

un engorgement considérable, des douleurs très vives, la fièvre, le délire, les abcès et la gangrene, voilà ce que produisent les lotions et ce qui est arrivé aussi dans le cas qui fait le sujet de l'observation.

Il est bien surprenant qu'il se rencontrent encore des chirurgiens qui mettent en pratique des moyens dont les pilouveniens ont été démentis par tous les bons praticiens; et il est encore plus surprenant que les mêmes chirurgiens, témoins des accidens que les remèdes occasionnent, n'y croient que des raisons pour justifier leur pratique; ils croient prévenir ce qu'ils font naître.

En réfléchissant sur la cause qui a dénudé le tibia, à l'étendue de la portion dénudée, au temps qu'elle a été exposée au contact de l'air et d'une tente garnie de charbon de fleur de vent, on croira difficilement qu'il ne se soit point fait d'exfoliation: ce qui aurait pu tromper M^r Vermillet, c'est qu'elle se sera faite d'une manière insensible, ainsi que cela est arrivé plusieurs fois.



Observation

Sur une loupe

En 1760, il survint à une femme âgée de 48 ans, après la perte subite de ses règles, une tumeur au genou droit, au dessus de la rotule, qui acquit insensiblement la grosseur et la figure d'un melon de trois livres, sans gêner les fonctions de cette partie et sans produire de douleurs.

Dix neuf ans après, elle fut atteinte d'un flux hémorroïdal qui dura près d'un an; elle perdait chaque jour 3 ou 4 onces de sang; la tumeur du genou s'alloupsait et devenait violente, lorsque l'évaluation du sang diminuait et vice versa.

À la fin d'août 1760, un écoulement qui fatigua beaucoup la Malade, succéda au flux hémorroïdal; elle ressentit quelques douleurs dans la tumeur, qui augmentèrent après une chute sur cette partie. La fièvre, la rougeur et la chaleur se manifestèrent, la tumeur absceda et la malade ne consentit pas à ce que un vermillot qui fut appliqué alors, eût l'ouverture. Cette tumeur s'ouvrit d'elle même la nuit suivante et malgré l'évaluation d'une grande quantité de Matières, elle était peu diminuée.

L'odeur et la qualité du pus firent reconnaître, quelques jours après, à monsieur vermillot, une disposition gangreneuse dans l'intérieur de la tumeur, ce qui le détermina à faire une petite incision en T à sa partie inférieure, à enlever ce qui était

9
était gangrénié; et il pansa avec la charpie sèche, comme plus convenable, dit-il, à la circonstance.

Cet appareil ne fut levé que 24 heures après; la gangrene était augmentée; il fit de nouvelles incisions, arrosa le tout avec de l'esprit de vin camphré, remplit la plaie de bouillons insérés de la teinture de Myrrhe et d'albès: par ces moyens les élargis de sevrèrent, la suppuration s'établit, les chairs devinrent vermeilles et cette plaie fut guérie en 35 jours.



Un Minoraif donné le 7^e jour après l'opération avait le développement: l'auteur fait observer que craignant les sinus dans l'artère il s'était abstenu de médicaments gras, son discours suppuratif; qu'il avait préféré l'incision en T à toute autre méthode, même à la séparation du kiste, qui eût été d'ailleurs impossible n'ayant aucune ligne de démarcation et à cause de la gangrene.

Ce qui pourrait mériter quelque attention dans cette observation c'est l'apparition de cette loupe après la perte des règles et le rapport observé, plusieurs années après, entre cette tumeur et le flux hémorroïdal, rapport tel, que cette tumeur augmentait de volume et devenait violette lorsque l'écoulement sanguin était moins considérable et qu'elle diminuait, lorsque le flux hémorroïdal était plus abondant: Si le même phénomène

18
Se présentait eulore n'en pourrait-on pas tirer quelque avantage
pour le traitement de ces maladies commençantes, en entretenant
le flux hémorroïdal, en le déterminant etc? C'est une réflexion
que nous soumettons au jugement de l'Académie.

La manière dont la tumeur s'est allouée, le volume qu'elle a
acquis sans cause d'accident, leur développement après une chute
sur cette partie, s'a terminaison par la suppuration, la mortification
et la putridité survenues après l'ouverture de la tumeur; tout cela est
en dans l'ordre des choses communes.

L'incision de la tumeur en T pratiquée par M. Vermillet convient
certainement, lorsque la tumeur était entière, on veut l'ouvrir dans
sonvir le Kiste, car alors il faut ouvrir une voie après grande pour
pouvoir exécuter cette opération et c'est ce que propose cette incision
et eulore mieux la T. Mais dans la circonstance où il l'a faite,
la tumeur percée depuis longtemps était presque vidée, le Kiste
était tombé en mortification, une simple incision pouvait donc suffire
pour eulover les lambeaux du Kiste putréfiés et détachés.

M^r Vermillet a eu raison de rejeter les suppuratifs gras, mais
les balsamiques et antiseptiques convenaient jusqu'à ce que
l'ulcère putride eut été débarrassé des parties mortes; alors on

On pouvait employer la charpie sèche, dont il se servit dans cet état de putréfaction.

L'avantage qu'il aurait pu retirer des scarifications qu'il fit au pansément n'aurait sans alléger la chute des escarres. En effet, à du être détourné par les lotions d'épave de vie. Rappelé par le détrempement des parties mortes, font qu'elles opposent une plus grande résistance à l'action vitale; c'est une vérité connue de tous les praticiens. Nous avons parlé dans nos remarques sur l'observation précédente, des ~~événements~~^{accidents} de ces mêmes lotions sur les parties sèches. Il suffit maintenant de dire qu'ils pourraient également avoir lieu dans le cas de l'Ex.



4^e observation

Sur une hernie avec étranglement

Un laboureur, âgé de 52 ans, avait depuis l'âge de 30 ans, une hernie complète à l'aîne droite, qui venait à volonté; le 20 juin 1778, cet homme éprouva les accidents qui sont la suite de l'étranglement, les quelles persistèrent malgré les secours de l'art, ce qui détermina M. Vermillet à faire l'opération le lendemain.

Le malade situé convenablement, l'anneau dirigé, le sac ouvert, il s'écoula une grande quantité d'eau souftrée qui avait une mauvaise odeur: l'intestin, qui avait une couleur brune fut réduit; et on appliqua l'appareil convenable qui ne fut levé que le 6^e jour après l'opération.

Les accidents cessèrent: à la levée du 2^e appareil M. Vermillet trouva la plaque sèche, la suppuration établie et le pus de bonne qualité: il la pansa pendant 8 jours comme une plaque simple avec le basilicum et le baume d'asclap ensuite avec la charpie sèche.

Pendant les 2^es jours il donnait au malade, dans la matinée, de 2 en 2 heures, un verre d'une décoction de K K, et dans la journée, deux demi-lavemens: il vendit par les selles quelque portion de la tunique interne de l'intestin semblable à celle qu'on peut voir dans les dysenteries putrides.

La diète fut très sévère; le malade ne prenait que gruau,
crème de pain, lait de poule &c. par le régime, dit l'auteur et mes
soins j'ai guéri parfaitement en 56 jours un malade qui aurait péri
ou du moins qui aurait bien eu des allidus à surmonter si j'avais diff-
férent plus longtemps une opération indispensable et qui fut faite
sans allidus et promptement.

Cette dernière observation ne contient rien dont l'Académie puisse
faire usage; c'est un fait de chirurgie, très commun, de même de plus
plusieurs circonstances essentielles: M^r. Vermillot se contente de dire que
le malade éprouva des allidus qui lui firent soupçonner un étranglement;
Mais il ne dit pas de quelle nature ils étaient: il nous laisse par consé-
quent ignorer les moyens qu'il a employés pour les combattre; l'état
de l'intestin peut le justifier sur le parti qu'il prit d'opérer cet homme
des lendemain, lorsqu'on fait attention que c'était une hernie
anciennement et que dans cette espèce, les allidus sont ordinairement moins
actifs, moins périlleux.

Ce qu'il dit de l'état de la plaie observé à la levée du res apparaît 3
jours après l'opération est peu conforme à ce que nous avons observé: les
plaies ne sont belles, pour me servir de son expression, qu'après la des-
tuction, l'exfoliation du sac, exfoliation qui se fait toujours et qui est plus
ou moins prompte relativement aux forces vitales et à la résistance des par-
ties à expulser: or dans le cas A, il y avait 50 ans que la hernie.

ou il a trouvé



existait, le sac devait être épais. Souffrablement la destruction n'a pu avoir lieu ni la plaie être belle en 3 jours.

Il suit de cette remarque sur la destruction du sac herniaire après l'opération (par l'inflammation qui y survient et la suppuration qui en est la suite) que ceux qui ont considérés les plaies comme simples, se sont trompés: Nous en pourrions encore tirer d'autres conséquences, mais nous nous bornons à celle qui a rapport à l'observation que nous venons d'examiner.

Quoique les observations de M. vermillet contiennent peu de choses intéressantes, l'académie doit toujours lui savoir gré des efforts qu'il fait pour mériter son suffrage: la multiplicité des observations qu'il y ~~en~~ envoie prouve aussi son zèle, son ardeur pour le travail.

Ce jeudi 1^{er} Mars 1782. L'héritier.



